

	診断	カンジダ腭外陰炎	細菌性陰炎	クラミジア 頸管炎	淋病	トリコモナス	生殖器ヘルペス	尖圭コンジローマ	おでき(粉瘤)
おりもの	色	白～黄緑	白、黄、灰	黄色、透明	黄緑、透明	黄色、淡い灰色	(-)	(-)	(-)
	形	酒粕、カッテージチーズ様	サラサラ、ねばねば		水っぽい	水っぽい		(-)	(-)
肉眼的変化	痒み	(+)	(+)			(+)			
	におい	(+)チーズ	(+)イカ臭い	(+)不快	(+)	(+)生臭い			
	顕微鏡でのカンジダの菌糸	(+)					大陰唇・小陰唇・会陰前肛門近辺・膣内・皮膚	大陰唇・会陰前肛門近辺・膣内・皮膚	皮膚
	部位	(-)	(-)	(-)					
	変化	(-)	(-)	(-)			びらん、水疱	小隆起(できもの)	小隆起(できもの)
	当日診断可能	(+)	疑い	(+)	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)
確定診断	(-)	培養検査	培養検査	培養検査		(-)	(-)	培養検査	

疾患	性感染症	オーラルセックス	性行為以外で感染	
トリコモナス	○		○	下着、タオル、便器、浴槽
カンジダ	○		○	免疫力が落ちた場合や抗生剤を長期服用時多発
クラミジア	○	○		淋菌の合併10%
淋病	○	○		初回性交後感染率30%と高い。クラミジアの合併30%
ヘルペス	○	○	○	感染したタオル
尖圭コンジローマ	○	○	○	皮ふや粘膜の傷口から
梅毒	○	○	△	傷口があればキスでも感染、刺青
エイズ	○	○	△	刺青

性病検査価格(円:税込)		Examination for STI	
クラミジア頸管炎あるいは尿道炎	3,000	Chlamydia cervicitis or urethritis	3,000
淋病	3,000	Gonorrhea	3,000
クラミジア&淋病	4,000	Chlamydia+Gonorrhea	4,000
梅毒	4,100	Syphilis	4,100
HIV	4,100	HIV	4,100
セットA(クラミジア、淋病、梅毒、HIV)	12,200	Set(Chlamydia,Gonorrhea,Syphilis,HIV)	12,200
咽頭クラミジア	3,000	Chlamydia pharyngitis	3,000
咽頭淋病	3,000	Gonococcal pharyngitis	3,000
咽頭クラミジア&淋病	4,000	Chlamydia+Gonorrhea for pharynx	4,000
カンジダ、トリコモナス	3,600	candida,trichomonas	3,600
セットB(クラミジア&淋病(膣と口腔)、梅毒、HIV、カンジダ、トリコモナス)	19,800	SetB(Chlamydia,gonorrhea,cervix or urethra & pharynx syphilis,HIV,Candida,trichomonas)	19,800

基本検査	対象となる主な疾患
・特定健康診査 ・貧血 ・肝機能 ・脂質 ・腎機能 ・尿酸 ・糖代謝 ・計測(身長・体重・BMI・腹囲・血圧・視力・聴力(オージオメーター))	
血液検査 [腫瘍マーカー検査] ・	子宮体がん(CA125) 卵巣がん(CEA,CA19-9)
X線検査 ・胸部単純X線撮影	肺結核、肺炎、肺癌
画像診断[超音波検査(エコー検査)] 卵巣がん検診目的の経膣エコー検査 乳がん検診目的のエコー検査(乳腺エコー)	乳がん、乳腺症
視診、触診 乳がん視触診	乳がん、乳腺症
視診、触診 細胞診検査 子宮頸がん細胞診	子宮頸がん
循環器関連検査 安静時心電図	不整脈、狭心症、心筋梗塞
その他検査 尿検査(尿糖、尿蛋白) 診察・問診/視触診/聴診 骨密度X線検査(骨粗鬆症検査) 骨塩量	
専門医対応 [撮影・問診・判定のいずれかを担当する医師] 日本産科婦人科学会認定 専門医	